



# Neosine syrop 0,25 g/5ml 150 ml



Cena: 19,99 zł

## Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Syrop

### Opakowanie

Butelka 150 ml

### Dawka


0,25 g/5ml

### Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. 5 ml syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu.

Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, wodorotlenek sodu, glikol propylenowy, aromat bananowy AR 0010, woda oczyszczona. 1 ml syropu Neosine zawiera 663 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę. Lek zawiera cukier sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

### Działanie



Neosine to lek, który walczy z najczęstszą przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych, czyli wirusami. Neosine zawiera w składzie inozynę pranobeks, substancję od lat stosowaną w lekach przeciwwirusowych i dobrze znaną wśród lekarzy. To ta substancja zapewnia podwójne działanie Neosine w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych takimi jak przeziębienie czy grypa.

Działanie przeciwwirusowe – po wnikięciu cząsteczki wirusa do komórki, inozyna hamuje proces translacji materiału genetycznego wirusa powstrzymując tym samym jego wzrost i dalsze namnażanie.

Działanie zwiększające odporność – pobudza organizm do wytwarzania komórek odpornościowych – limfocytów typu T.

### Wskazania

Neosine wskazane jest do stosowania dla dzieci i osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, również w zakażeniach skóry i błon śluzowych wywołanych wirusem Herpes simplex typu 1 i 2 (opryszczka) oraz wirusem Varicella zoster (ospa wietrzna, półpasiec), a także w innych zakażeniach o etiologii wirusowej (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu). Wspomagająco preparat jest wskazany u osób z obniżoną odpornością.

### Sposób użycia

Dawka Neosine ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 ml/kg masy ciała/dobę, zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała/dobę, zwykle 1 ml na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

### Neosine nie należy stosować:

U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczaniowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku.