

# Nifuroksazyd 200mg tabletki 12 szt. HASCO

Cena: 5,37 zł



## Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Opakowanie

1 op 12 tabletek

### Dawka

200 mg

### Skład

1 tabletkę zawiera: substancje czynne: nifuroksazyd 200mg skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian, otoczek żółta Opadry o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak E 104, żółcień chinolinowa, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E 110, lak E 132, indygotkarmin.

### Działanie

Lek działa szybko przeciwbakteryjnie, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu. Po podaniu doustnym praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest w postaci niezmienionej z kałem. Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza



prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

#### **Wskazania**

Lek stosowany jest w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

#### **Sposób użycia**

Lek stosuje się doustnie. Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

#### **Uwaga**

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

#### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki preparatu, nie stosować u dzieci do 7 roku życia. Przed zastosowaniem u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.