



apteka  
w sieci

## NIZORAL szampon przeciwłupieżowy 60 ml



Cena: 25,93 zł

### Opis słownikowy

Producent	Johnson & Johnson
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać:

Szampon

#### Dawka:

20 mg/g

#### Opakowanie:

Butelka 60 ml

#### Skład:

Ketokonazol 20 mg oraz substancje pomocnicze: sól sodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, sól disodowa eteru laurylosulfonowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona

#### Działanie:

Jest to antybiotyk przeciwgrzybiczny, który działa na grzyby (na ich błonę komórkową). Pochodna imidazolu, lek przeciwgrzybiczny w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Hamuje biosyntezę ergosterolu, niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co powoduje zmiany jej przepuszczalności i prowadzi do obumarcia komórki. Ketokonazol działa na dermatofity, drożdżaki (m.in. *Pityrosporum ovale*) oraz grzyby dimorficzne. Wchłanianie przez skórę zachodzi w niewielkim stopniu. Lek nie przenika do krwi i nie wywiera działania układowego. Szampon szybko usuwa świąd i łuszczenie się skóry, zmniejsza przetłuszczanie się włosów i skóry



apteka  
w sieci

głowy. Wywiera działanie przeciwgrzybiczne jeszcze przez kilka dni po umyciu włosów.

**Wskazania:**

Lecznico i zapobiegawczo w łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu skóry i łupieżu pstrym.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na pochodne imidazolu lub pozostałe składniki preparatu.

**Ostrzeżenia:**

Zachować ostrożność, stosując lek bezpośrednio po długotrwałym miejscowym leczeniu kortykosteroidami (zaleca się stopniowe ich odstawianie w ciągu 2 tygodni przy jednoczesnym stosowaniu szamponu).

**Dawkowanie:**

Niewielką ilość szamponu nanieść na skórę głowy, wetrzeć i pozostawić na około 5 min, a następnie spłukać. W łupieżu zwykłym i łojotokowym zapaleniu skóry preparat stosuje się leczniczo 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie; profilaktycznie raz na 1-2 tygodnie. W łupieżu pstrym: leczniczo - raz dziennie przez 5 dni; profilaktycznie przed okresem letnim - raz dziennie przez kolejne 3 dni.