

No-Spa Comfort 40mg tabletki powlekane x 20 szt.

Cena: 10,63 zł



Opis słownikowy

Producent	SANOFI AVENTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Dawka

40 mg

Opakowanie

20 tabletek

Skład

Drotaweryna 40 mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, lecytyna (sojowa), karmin (E 120), tartrazyna (E 102)

Działanie

Lek NO-SPA Comfort zawiera jako substancję czynną chlorowoderek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, najczęściej objawiającym się bólem w jamie brzusznej. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.



Wskazania

W stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater. W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Oraz wspomagająco: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki. W schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu. W napięciowych bólach głowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia

Ze względu na zawartość laktozy lek może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancją laktozy. Ze względu na obecność tartrazyny lek może powodować reakcje alergiczne. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w ciąży.

Dawkowanie

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką.