



apteka
w sieci

No-Spa MAX 80 mg tabletki powlekane 48 szt.

Cena: 43,47 zł



Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	48 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	OPELLA HEALTHCARE COMMERCIAL LTD.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Drotaverini hydrochloridum

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

48 szt.


Działanie

Lek **No-Spa Max** zawiera substancję czynną chlorowoderek drotaweryny, stosowaną w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, objawiającym się najczęściej bólem w obrębie jamy brzusznej. Rozkurczowe działanie drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek **No-Spa Max** jest metabolizowany w wątrobie, wydalany głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.

Wskazania

Lek **No-Spa Max** wskazany jest do stosowania:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowych, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera
- w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz



wspomagająco:

apteka

- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki

- w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Sposób użycia

• **Dorośli** - 1 tabletkę powlekaną 2 lub 3 razy na dobę; dawka dobową wynosi 120 do 240mg.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 7 dni.

Ostrzeżenia

Leku **No-Spa Max** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników aktywnych,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,
- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest drotaweryna. Każda tabletkę powlekaną zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, talk. Otoczka tabletki: Opadry II yellow 85G32207: alkohol poliwinylowy, talk, żółcień chinolinowa lak (E 104), makrogol, tytanu dwutlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).