



apteka
w sieci

Nomigren 12,5 mg tabletki powlekane 2 szt.

Cena: 19,96 zł



Opis słownikowy

Dawka	12,5 mg
Opakowanie	2 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Almotriptanum

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

2 szt.

Działanie

NOMIGREN to lek przeciwmigrenowy, należący do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Zawiera substancję czynną - almotryptan, który wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu (czaszce) wpływając na ich zwężenie, prowadząc do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną.

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy w ostrych napadach migreny z aurą lub bez aury.

Sposób użycia

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat

Zalecana dawka to jedna tabletkę (12,5 mg). Tabletkę należy przyjąć najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny. Jeżeli napad migreny nie ustąpi, nie przyjmować więcej niż jedną tabletkę podczas tego samego napadu.



Jeśli u pacjenta wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej tabletki.

Maksymalna dawka dobową to dwie tabletki (25 mg) w ciągu 24h. Tabletkę należy połączyć popijając płynem (np. wodą). Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ostrzeżenia

Leku **NOMIGREN** nie należy stosować:

- W profilaktyce migreny,
- Jeśli pacjent ma uczulenie na almotryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała choroba, która ograniczała dopływ krwi do serca, taka jak:
 - zawał serca,
 - dusznica bolesna,
 - ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący zwykle podczas aktywności lub stresu,
 - problemy z sercem bez towarzyszącego bólu,
 - ból w klatce piersiowej występujący podczas spoczynku,
 - ciężkie nadciśnienie tętnicze (bardzo wysokie ciśnienie krwi),
 - niekontrolowane łagodne bądź umiarkowane wysokie ciśnienie krwi.
- Jeśli pacjent przeżył udar mózgu lub wystąpiło u niego zmniejszenie przepływu krwi do mózgu.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła niedrożność w dużych naczyniach krwionośnych ramion lub nóg (choroba naczyń obwodowych).
- Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki stosowane w leczeniu migreny zawierające ergotaminę, dihydroergotaminę czy metysergid lub inne leki z grupy agonistów serotoniny (np. sumatryptan)
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Skład

Substancją czynną leku jest almotryptan. Jedna tabletkę zawiera 12,5 mg almotryptanu (w postaci almotryptanu jabłczanu). Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, kerboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K29-32, sodu stearylofumaron, otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171)), makrogol 400, воск Carnauba.