

# Nurofen Express Forte 400mg kapsułki 20 szt.

Cena: 19,58 zł



## Opis słownikowy

Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Szybka ulga  
w ostrym bólu

20 KAPSULEK

## Opis produktu

### Postać leku:

Kapsułki miękkie

### Dawka:

400 mg

### Opakowanie:

20 kapsułek

### Skład:

1 tabletkę zawiera Ibuprofen 400 mg substancje pomocnicze: makrogol 600, potasu wodorotlenek (50% roztwór) żelatyna, srbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, czerwien koszenilowa (E124) lecytyna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, atrament Opacode NSP - 78-18022 (tytanu dwutlenek (E 171) poliwinylu octanoftalan, makrogol 400, amonowy wodorotlenek).

### Działanie:

Lek należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dzięki maksymalnej dawce ibuprofenu 400 mg zamkniętej w żelowej kapsułce bardzo szybko działa. Stworzony do usuwania szczególnie dotkliwych bólów. Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka, ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania. Polecany w bólach głowy, np. migrena; bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie oraz gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.



#### Wskazania:

Polecany w bólach w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego. Lek zwalcza bóle głowy, zębów, bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie. Wskazany również w gorączce w przebiegu grypy lub przeziębienia lub innych chorobach zakaźnych.

#### Przeciwwskazania:

Nurofen nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którykolwiek składnik leku
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, ównież tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężą niewydolnością serca,
- przyjmujących jednocześnie inne NLPZ, w tym inhibitory COX- 2,
- w III trymestrze ciąży,
- ze skazą skrwtoczną.
- Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

#### Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 40 kg. 1 tabletkę co 4 godziny. Tabletkę należy popijać wodą. Lek stosować doustnie krótkotrwale. Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Nie należy rozgryzać kapsułek.

#### Działania niepożądane:

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.