



apteka
w sieci

Nurofen Forte 400mg tabletki 48szt.

Cena: 29,58 zł



Opis słownikowy

Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Postać leku:

Tabletki powlekane

Dawka:

400 mg

Opakowanie:

24 tabletki

Skład:

1 tabletki zawiera Ibuprofen 400 mg Pozostałe składniki: sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka cukrowa: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 6000, tusz Opacode S-1-15094 (szelak, żelaza tlenek czerwony (E 172), glikol propylenowy, simeticon).

Działanie:

Dzięki maksymalnej dawce ibuprofenu 400 mg. stworzony do usuwania szczególnie dotkliwych bólów. Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka, ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania. Polecany w bólach głowy, np. migrena; bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie oraz gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

Wskazania:



Polecany w bólach w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego. Lek zwalcza bóle głowy, zębów, bóle okolicy krzyżowej, nerwoból, bolesne miesiączkowanie. Wskazany również w gorączce w przebiegu grypy lub przeziębienia lub innych chorobach zakaźnych.

Przeciwwskazania:

Nurofen nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na ibuprofen lub którykolwiek składnik leku
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
- z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, ównież tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
- przyjmujących jednocześnie inne NLPZ, w tym inhibitory COX- 2,
- w III trymestrze ciąży,
- ze skazą skrwtoczną.
- Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny. Tabletkę należy popijać wodą. Lek stosować doustnie krótkotrwale. Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

Działania niepożądane:

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcie, zaparcie, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki.