



Octenisept płyn 100 ml



Cena: 31,12 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Dawka | (100mg+2g)/100g |
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | płyn |
| Producent | SCHULKE & MAYR GMBH |
| Rejestracja | Preparat dezynfekcyjny |
| Substancja czynna | Octenidinum, Phenoxyethanolum |

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

100ml

Działanie

Octenisept to lek dezynfekujący w postaci płynu o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Działanie leku utrzymuje się przez godzinę, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub pooperacyjnych.

Wskazania

Lek **Octenisept** stosowany jest w celu:

- odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchniowych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi,
- wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie powierzchni zamkniętych powłok skórnych po zabiegach - np. szwów pooperacyjnych,
- wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądździ prącia, jak również przed



cewnikowaniem pęcherza moczowego,

- w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowninowego),
- do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowanego noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej),
- ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej,
- w obrębie narządów rodnych, np. stanach zapalnych pochwy oraz w obrębie żołądki prącia mężczyzny.

Octenisept może być stosowany u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Sposób użycia

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek **Octenisept** zalecany jest do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

Ostrzeżenia

Leku **Octenisept** nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować leku **Octenisept** do płukania jamy ustnej.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol. 100 g płynu zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodoru i 2,00 g fenoksyetanolu. Pozostałe składniki to: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38%)octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorowęglan, woda oczyszczona.