



apteka
w sieci

OCTENISEPT Preparat do dezynfekcji ran 1000ml

Cena: 60,40 zł



www.aptekawsieci.pl

Opis słownikowy

Producent	SCHULKE
Rejestracja	Preparat dezynfekcyjny

Opis produktu

Postać:

Płyn

Opakowanie:

Butelka 1000 ml

Skład:

Dichlorowodorek octenidyny 0,10 g, alkohol fenoksyetylowy 2 g oraz substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona

Działanie:

Lek Octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: dichlorowodorek octenidyny, alkohol fenoksyetylowy. Lek Octenisept działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Wskazania:

Do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z zaopatrywaniem ran, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatricznym, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.:

- przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych



- przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych
- przy płukaniu otwartych opni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp.
- przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych
- w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołądźci prącia mężczyzny
- przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym
- przy cewnikowaniu
- przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie
- do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
- przed badaniami andrologicznymi
- w pediatrii
- do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

Ostrzeżenia:

Przy płukaniu ran należy uważać, aby preparat nie był wprowadzany względnie wstrzykiwany do tkanki pod ciśnieniem. W przypadku płukania jam rany należy zwracać uwagę, aby był zapewniony odpływ (np. drenaż, odsysacz). Unikać kontaktu leku z oczami. Nie zaleca się stosowania leku Octenisept do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania. Zastosowanie preparatu Octenisept do płukania jamy brzusznej nie jest na chwilę obecną poparte dostateczną ilością badań klinicznych i podlega decyzji lekarza.

Sposób użycia:

Lek Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. Do stosowania na ranę, błonę śluzową i skórę.