



apteka
w sieci

Olimp Luteina Max-Complex tabletki 30szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 28,89 zł



Opis słownikowy

Producent	OLIMP
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

1 op. 30 tabletek


Skład

Składniki: maltodekstryna, ekstrakt z owoców borówki czarnej (*Vaccinium myrtillus* L.) 25% antocyjanidyn; luteina i zeaksantyna (z *Tagetes erecta* L.), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy (PVA), talk, glikol polietylenowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancje przeciwbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwniki - dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 tabletkę zawiera: luteina 30mg, zeaksantyna 2,5mg, ekstrakt z owoców borówki czarnej (*Vaccinium myrtillus* L.) 50mg (w tym: antocyjanidyny 12,5mg).

Działanie

Preparat zawiera aż 30 mg luteiny w jednej tabletkę dodatkowo wzbogacony jest zeaksantyną oraz ekstraktem z borówki czarnej. Skutecznie usuwa objawy zmęczonego wzroku poprawia widzenie. Ekstrakt z owoców borówki czarnej zawierający antocyjanidyny korzystnie wpływa na wzrok poprzez właściwości antyoksydacyjne (dzięki czemu neutralizuje efekty działania wolnych rodników powstających w organizmie) oraz ma dobroczynny wpływ na naczynia krwionośne. Luteina, podobnie jak zeaksantyna są barwnikami z grupy karotenoidów naturalnie występującymi w roślinach. Luteina wraz z zeaksantyną skumulowana jest w największym stopniu w



soczewce oka i w centralnej części siatkówki - plamce żółtej. Dodatkowo również rozproszona jest w całej siatkówce i soczewce. Plamka żółta siatkówki dzięki swojej specyficznej budowie umożliwia tzw. centralne widzenie oraz odpowiada za ostrość widzenia.

Wskazania

Dla dorosłych celem poprawy wzroku: w szczególności polecany osobom wykonującym pracę w sztucznym świetle, pracę biurową przy komputerze, odczuwającym zmęczenie wzroku, oraz dla osób w średnim i starszym wieku.

Sposób użycia

1 tabletką w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.