



apteka
w sieci

Original Tymianek i Podbiał pastylki do ssania 16 szt. (Lek OTC)

Cena: 15,73 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	16 szt.
Postać	pastylki twarde
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek ziołowy

Opis produktu

Postać

Pastylki twarde

Opakowanie

16 szt.

Działanie

ORIGINAL Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny w postaci pastylek o działaniu powlekającym. Zawiera polisacharydy śluzowe tworzące warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działanie odruchowe błony śluzowej gardła, dzięki czemu łagodzi kaszel.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny **ORIGINAL Tymianek i Podbiał** wskazany jest do stosowania w celu łagodzenia chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia

Zalecane dawkowanie:



• **Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia** - ssać powoli po 1 pastylce co 4-6 godzin.

Dawka maksymalna to 6 pastylek na dobę. Pastylki należy ssać powoli. Wspomaga to wydzielanie śliny, dzięki czemu zwilża błonę śluzową jamy ustnej i gardła redukują nasilenie kaszlu.

Ostrzeżenia

Leku **ORIGINAL Tymianek i Podbiał** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z ziela tymianku lub wyciąg z ziela podbiału lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli pacjent jest uczulony na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteracea - dawniej Compositae), np. rumianek, jeżówkę, arnikę lub jasnotowatych (Lamiaceae - dawniej Labiatae), np. szalwię,

- nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12. roku życia.

Uwagi

- Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenie należy zgłosić do lekarza.

- Jedna pastylka zawiera nie więcej niż 0,15 µg alkaloidów pirolizydynowych. Nie zaleca się przekraczania rekomendowanej maksymalnej dawki dziennej 6 pastylek, ani przewlekłego stosowania leku, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby przy nadużywaniu leku. Nie zaleca się stosowania pastylek przez zbyt długi okres czasu, tj. nie dłużej niż 4 do 6 tygodni w roku.

- Leku nie należy stosować łącznie z innymi lekami złożonymi, zawierającymi liści podbiału lub wyciągi z liści podbiału. Lek zawiera sacharozę i glukozę.

- Ze względu na zawartość cukru lek należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: gęsty wodny wyciąg z ziela tymianku (thymi herbae extractum spissum, DER 3,5 - 4,5:1) 100 mg oraz gęsty wodny wyciąg z liścia podbiału (Tussilaginis farfarae folii extractum spissum, DER 4,5 - 6,0:1) 100 mg. Pozostałe składniki: sacharoza, glukoza ciekła.