



Orofar aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 ml

Cena: 20,69 zł



Opis słownikowy

Producent	NOVARTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aerozol

Dawka

2mg+1.5mg

Opakowanie

30 ml

Skład:

Jeden ml roztworu zawiera substancje czynne: 2mg benzoksoniowego chlorku, 1,5mg lidokainy chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1N, woda czyszczona. jedna dawka zawiera 0,2798mg benzoksoniowego chlorku i 0,2098mg lidokainy chlorowodoru.

Działanie

Preparat o szerokim zakresie działania, znosi ból w gardle, zmniejsza obrzęk i pieczenie, walczy z wirusami i grzybami w obrębie gardła i krtani. Chlorek benzoksoniowy, kationowy związek powierzchniowo czynny, działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo (zwłaszcza bakterie odpowiedzialne za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczące w tworzeniu płytki nazębnej), a także grzybobójczo i przeciwwirusowo (wirus grypy, paragrypy, herpeswirusy). Praktycznie nie wchłania się. Lidokaina działa miejscowo znieczulająco. Wchłania się przez błonę śluzową policzków.



Wskazania

Infekcje gardła, krtani, angina, zapalenie strun głosowych. Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina). Orofaryngolizol zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej. Lidokaina zawarta w preparacie działa miejscowo znieczulająco zmniejsza ból, ułatwia przełykanie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Dzieci poniżej 6 roku życia. Nie stosować u osób z tendencją do zachłystowania, zwłaszcza u osób powyżej 60 roku życia.

Dawkowanie

Dorośli: 4 razy rozpylać w jamie ustnej lub na tylną część gardła 3-6 razy dziennie; dzieci powyżej 4 r.ż.: rozpylać 2-3 razy dziennie.

Ostrzeżenia

Niekiedy może dojść do przemijającego, miejscowego podrażnienia. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje alergiczne w postaci wysypki skórnej, obrzęku jamy ustnej lub krtani.