



apteka
w sieci

Orsalit nutris o smaku malinowo-jagodowym, saszetki x 10 szt.



Cena: 18,27 zł

Opis słownikowy

Producent	IBSS BIOMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Proszek o smaku malinowo-jagodowym

Opakowanie

10 saszetek

Doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu jest zgodny z zaleceniami ESPGHAN. ORSALIT nutris uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, wzbogacony jest laktoalbuminą, białkiem występującym w mleku. Laktoalbumina dostarcza aminokwasów egzogennych, czyli aminokwasów, które nie są wytwarzane przez organizm człowieka i muszą być podane wraz z pożywieniem. Dzięki nowej formule, słony smak jest słabo wyczuwalny.

Wskazania

Uzupełnienie płynów i składników mineralnych podczas biegunki lub wymiotów. Dla niemowląt od 6 miesiąca życia, dzieci i osób dorosłych. Orsalit skutecznie nawadnia dzięki wykorzystaniu efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy. Dzięki temu preparat zmniejsza ryzyko powikłań będących następstwem biegunek i wymiotów.

Sposób użycia


Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza.

Zwykle zaleca się podawać 50-100ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Ilość, dobową dawkę oraz czas stosowania preparatu, które wpływają na uzyskanie efektu zdrowotnego są uzależnione od wieku, masy ciała i fazy nawadniania.

Przykładowe dawkowanie preparatu	
Osoba otrzymująca preparat	FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)
Masa ciała od 8 do 12 kg (wiek: od 6 miesięcy do 1 roku)	3 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem Podawać w ciągu 3-4 godzin
Masa ciała od 12 do 15 kg (wiek: od 1 roku do 2 lat)	4 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem Podawać w ciągu 3-4 godzin
Masa ciała powyżej 15 kg (wiek: powyżej 2 lat)	6 saszetek rozpuszczonych zgodnie z zaleceniem Podawać w ciągu 3-4 godzin

Ostrzeżenia



Nie należy stosować u osób, u których występuje uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawodnienia dozynowego oraz osób ze stwierdzoną alergią na białka mleka krowiego. Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza). W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu.

Skład

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, laktoalbumina - białko pochodzące z mleka krowiego, chlorek sodu, chlorek potasu, aromaty.

Nie zawiera owoców. Produkt zawiera cukier.