




Pantoprazol Teva 20mg tabletki dojelitowe x 14 szt.

Cena: 7,90 zł



Opis słownikowy

Producent	TEVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki dojelitowe

Opakowanie

1 op. 14 tabletek

Działanie

Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje enzymy wytwarzające kwas solny w żołądku. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku zmniejszając refluks. Refluku polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Wskazania

Refluks przełyku, zgaga, kwaśne odbijanie.

Sposób użycia

Polecane dawkowanie; jedna tabletki na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki 20 mg pantoprazolu na dobę. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni. Jeśli po upływie 2 tygodni pacjent nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.



Przeciwwskazania

apteka

Pantoprazol Teva nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat z powodu braku informacji dotyczących bezpieczeństwa w tej młodszej grupie pacjentów. Nie należy przyjmować Pantoprazolu Teva z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Pantoprazol Teva można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan lub ich połączenia). Nie należy stosować leku Pantoprazol Teva u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Skład

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletkowa dojelitowa zawiera 20mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Ponadto lek zawiera disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksym etyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E172).