

Paracetamol farmina 250mg czopki x 10 szt.

Cena: 5,86 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Producent | FARMINA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Postać

Czopki doodbytnicze

Dawka

250 mg

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Czopki doodbytnicze **Paracetamol Farmina** wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Zawierają substancję czynną paracetamol w dawce 250 mg w pojedynczym czopku.

Wskazania

Czopki Paracetamol Farmina stosowany jest:

- w bólach różnego pochodzenia (ból głowy, ból mięśni, ból zębów, bóle stawowe i kostne, bolesne miesiączkowanie, ból po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym),
- w leczeniu objawowym przeziębienia i grypy,



• w celu obniżenia gorączki przy różnych infekcjach oraz po szczepionkach.

Sposób użycia

Lek **Paracetamol Farmina 250 mg** przeznaczony jest do podawania doodbytniczego. Lek należy stosować w przeliczeniu na masę ciała dziecka, przybliżony wiek dziecka został podany jako ogólna wskazówka. Jednorazowo zaleca się stosować 10 do 15 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka. Maksymalna dawka wynosi 60 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka na dobę. Od 16,6 kg do 25 kg (od około 3 do 7 lat) - 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Lek należy stosować w przeliczeniu na masę ciała dziecka, przybliżony wiek dziecka został podany jako ogólna wskazówka. Jednorazowo zaleca się stosować 10 do 15 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka. Maksymalna dawka wynosi 60 mg paracetamolu na kg masy ciała dziecka na dobę. Od 33,3 kg do 50 kg (od około 10 do 13 lat) - 1 czopek 3 do 4 razy na dobę. Stosować nie częściej niż co 4 godziny.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia

Leku **Paracetamol Farmina** nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na paracetamol,
- nadwrażliwości na pozostały składnik leku,
- ciężkiej niewydolności nerek i/lub wątroby.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Substancja pomocnicza to tłuszcz stały.