



apteka  
w sieci

# Paracetamol Hasco 125 mg czopki x 10 szt.

Cena: 5,20 zł



## Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Czopki

### Dawka

125 mg

### Opakowanie

10 czopków

### Działanie

**Paracetamol Hasco** to lek w postaci czopków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godz. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godz.

### Wskazania

Bóle różnego pochodzenia, stany gorączkowe. Przeziębienie przebiegające z gorączką.

### Dawkowanie

Czopki **Paracetamol Hasco** stosuje się doodbytniczo. U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. U dzieci dawkę ustala się wg



masy ciała (przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10-15mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej:

3 miesiące	80 mg
2-3 lata	125 mg
4-6 lat	125 mg do 250 mg
7-8 lat	250 mg
9-10 lat	250 mg do 500 mg
11-12 la	500 mg

Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę nie częściej niż co 4 godziny. U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.

#### Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku Paracetamol, jeśli występuje nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, ciężka, niewydolność nerek.

#### Uwagi

Bez zalecenia lekarza nie stosować:

- przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,
- w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,
- w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.

W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol. Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe czy też ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Skład

Paracetamol 125 mg oraz substancja pomocnicza: tłuszcz stały (Witepsol S58)