



apteka
w sieci

Paracetamol Hasco 500 mg czopki x 10 szt.

Cena: 5,51 zł



Opis słownikowy

Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Czopki

Dawka

500 mg

Opakowanie

10 czopków

Działanie

Paracetamol Hasco to lek w postaci czopków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godz. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godz.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia, stany gorączkowe. Przeziębienie przebiegające z gorączką.

Dawkowanie

Czopki **Paracetamol Hasco** stosuje się doodbytniczo. U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. U dzieci dawkę ustala się wg



masy ciała (przeciętna jednorazowa dawka wynosi 10-15mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej:

3 miesiące	80 mg
2-3 lata	125 mg
4-6 lat	125 mg do 250 mg
7-8 lat	250 mg
9-10 lat	250 mg do 500 mg
11-12 la	500 mg

Pojedynczą dawkę można podawać 4 razy na dobę nie częściej niż co 4 godziny. U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku Paracetamol, jeśli występuje nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, ciężka, niewydolność nerek.

Uwagi

Bez zalecenia lekarza nie stosować:

- przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci,
- w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni,
- w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.

W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol. Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe czy też ryfampicyna, a także równoczesne picie alkoholu, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Skład

Paracetamol 500 mg oraz substancja pomocnicza: tłuszcz stały (Witepsol S58)