



apteka
w sieci

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

PetitDrill Suchy Kaszel syrop od 6. miesiąca 125 ml

Cena: 17,26 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------------|
| Opakowanie | 125ml |
| Postać | syrop |
| Producent | PIERRE FABRE MEDICAMENT |
| Rejestracja | |

Opis produktu

Postać

Syrop o smaku truskawkowym

Opakowanie

Butelka 125 ml z pipetą

Działanie

Syrop tworzy cienką warstwę ochronną i nawilża gardło, co umożliwia złagodzenie podrażnienia związanego z suchym kaszlem, w tym kaszlem spowodowanym zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, takimi jak dym papierosowy, zanieczyszczenie, kurz, suche powietrze itp.

Wskazania

Dla dzieci od 6 miesiąca życia, łagodzi podrażnienie związane z suchym kaszlem.

Sposób użycia

Dzieci od 6-12 miesięcy jedna dawka 5 ml na dobę, dzieci od 1-6 lat jednorazowo dwie dawki po 5ml na dobę. W przypadku utrzymywania się objawów przez ponad 3 dni należy skonsultować się z lekarzem. U niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy, konsultacja medyczna jest wskazana.

Aby nabrać dawkę 5 ml syropu wprowadzić pipetę do butelki, odciągnąć biały tłok do czarnego oznaczenia na korpusie pipety.



Wprowadzić końcówkę pipety do ust dziecka będącego w pozycji uniemożliwiającej dostanie się syropu do dolnych dróg oddechowych (aby zapobiec zachłyśnięciu). Następnie wolno i płynnym ruchem wcisnąć tłok pipety, by dziecko mogło połknąć syrop. W przypadku pominięcia podania syropu Petit Drill o zamierzonej godzinie nie należy stosować podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo zalecaną dawkę, dostosowaną do wieku dziecka. Po każdym użyciu należy przepłukać pipetę zimną wodą, kilkakrotnie nabierając i wypuszczając wodę.

Przeciwwskazania

Niemowlęta w wieku poniżej 6 miesięcy. Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu. Nietolerancja fruktozy (ze względu na obecność maltitolu). Jeśli dziecko choruje na cukrzycę, należy uwzględnić ilość 0,75 g uwodornionej glukozy zawartej w 5 ml syropu w związku z obecnością płynnego maltitolu (środka słodzącego).

Szczelnie zamkniętą butelkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki. Nie stosować po upływie terminu ważności (podanego na etykiecie butelki i/lub na pudełku).

Skład

Glicerol, maltitol ciekły, hydroksyetylocelulozam sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat truskawkowy, woda oczyszczona. / Pipeta: polietylen (korpus), polistyren (tłok).