



apteka
w sieci

Phlebodia 600mg tabletki powlekane x 30 szt.

Cena: 33,76 zł



Opis słownikowy

Producent	LABORATORIES INNOTHERA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Dawka

600mg

Opakowanie

30 tabl

Działanie

Preparat stosowany w celu zmniejszenia objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żyłaków kończyn dolnych), uczucia ciężkości nóg, bólów, dolegliwości spowodowanych zespołem niespokojnych nóg zmuszających do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe żyłaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

Wskazania

Żyłaki kończyn dolnych, żyłaki odbytu, niewydolności krążenia żylnego, bólu i uczucia ciężkości nóg. Dolegliwości spowodowane odlegżynami. Terapia uzupełniająca w przypadku podatności naczyń włosowatych na pęknięcie.

Przeciwwskazania



Nie należy stosować leku Phlebodia w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie

W niewydolności krążenia żylnego: 1 tabletkę dziennie, rano, na czczo. Żylaki odbytu: 2-3 tabletki dziennie, przed posiłkiem.

Skład

1 tabletkę zawiera 600 mg diosminy oraz substancje pomocnicze: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, substancja powlekająca Sepifilm 002, celuloza mikrokrystaliczna. Składniki otoczki: substancja powlekająca: sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian, substancja barwiąca: sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek, lak czerwień koszenilowej, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, alkohol etylowy 95%, guma lakowa, wosk Carnauba, wosk pszczeli.