



# PILARIX krem nawilżająco-pielęgnacyjny do skóry 100 ml

Cena: 34,47 zł



## Opis słownikowy

Producent	LEFROSCH
Rejestracja	Kosmetyk

## Opis produktu

### Postać:

Krem

### Opakowanie:

Tubka 100 ml

### Skład:

Auqa, Urea, Ethylhexyl, Stearate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Dicapryl Carbonate, Ceteareth 25, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Salicylic Acid, Panthenol, Ethylparaben, Allantoin, Magnesium Sulfate 7 x Hydrate

### Działanie:

PILARIX krem to nowoczesny preparat skutecznie zapobiegający nadmiernemu rogowaceniu skóry. Poprzez zwiększenie nawilżenia warstwy rogowej naskórka przyspiesza procesy regeneracji skóry w przebiegu wielu dermatoz, działa przeciwzapalnie. PILARIX krem zawiera:

- kwas salicylowy 2 % - ułatwia oddzielenie się nawarstwionych rogowaceń naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
- panthenol - działa kojąco, przeciwzapalnie w przypadkach podrażnień, niezależnie od przyczyny
- alantoinę - przyspiesza regenerację skóry chorobowo zmienionej, podrażnionej, biologicznie uszkodzonej
- masło shea.



**Wskazania:**

Rogowacenie okołomieszkowe. Wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia. Przewlekła suchość skóry. Jako środek przyspieszający regenerację skóry między okresami sterydoterapii zewnętrznej. Po depilacji mechanicznej.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki kremu, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub wątroby. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

**Ostrzeżenia:**

W przypadku zastosowania kremu na skórę uszkodzoną, podrażnioną, w stanie zapalnym lub posiadającą na swojej powierzchni zmiany zapalne w postaci grudek bądź krost może wystąpić pogorszenie stanu zapalnego z towarzyszącym świądem. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania kremu.

**Sposób użycia:**

Stosować 2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.