



Cena: 69,90 zł

Opis słownikowy

Producent	PROBIONOV
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Lakier

Opakowanie

Pojemnik 4g

Skład

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg cyklopiroksu.

Pozostałe składniki: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylovym kwasu 2-butenodiowego.

Działanie

Leczniczy lakier do paznokci o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do miejscowego stosowania w przypadku grzybicy paznokci. Zawiera substancję czynną - cyklopiroks, który przenika przez płytkę paznokcia i działa przeciwgrzybiczo na grzyby powodujące grzybicę paznokci.

Wskazania

Leczenie łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci.



Sposób użycia

apteka
W sieci

- Stopy bądź ręce umyć wodą z mydłem i delikatnie osuszyć.
- Za pomocą jednorazowego pilnika delikatnie opiłować wierzchnią warstwę płytki paznokciowej. Za każdym razem należy usuwać możliwie największą część chorego paznokcia. Uwaga! Po użyciu pilnik należy wyrzucić!
- Przetrzeć płytkę paznokciową wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu.
- Lakier należy nanieść równomiernie pędzelkiem na zmienioną chorobowo płytkę paznokciową i pozostawić do wyschnięcia.

Nie na płytkę paznokciową produktów kosmetycznych (np. lakiery ozdobne, odżywki do paznokci) lub sztucznych paznokci.

Po użyciu lakier należy szczelnie zamknąć, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Należy unikać rozlewaniu lakieru na gwint szyjki butelki, aby zakrętka się nie przyklejała.

Dawkowanie

Przez pierwszy miesiąc leczenie cienką warstwą lakieru należy nakładać na zmieniony chorobowo paznokieć co drugi dzień. Zapewnia to nasycenie paznokcia substancją czynną. W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ograniczyć do dwóch razy w tygodniu, a od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu.

W całym okresie leczenia należy

- raz w tygodniu zmyć całą warstwę lakieru kosmetycznym zmywaczem do paznokci; aby zapewnić właściwe wnikanie substancji czynnej
- przed kolejnym nałożeniem lakieru opiłować jednorazowym pilnikiem płytkę paznokciową (po użyciu pilnik należy wyrzucić)

W przypadku uszkodzenia lub starcia warstwy lakieru w trakcie leczenia wystarczy polakierować odsłonięte miejsce.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Leku nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.