

# Polopiryna Max tabletki dojelitowe 0,5g 20 szt.

Cena: 16,13 zł



## Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tabletki dojelitowe

### Dawka

500mg

### Opakowanie

20 tabletek


### Skład

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 500mg oraz substancje pomocnicze.

### Działanie

Dzięki działaniu przeciwbólowemu, przeciwzapalnemu i przeciwgorączkowemu zwalcza objawy grypy i przeziębienia oraz objawy bólowe, łamanie w kościach, dreszcze, katar. Zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Tabletkę dojelitową rozpada się dopiero w jelicie cienkim, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

### Wskazania



Bóle o lekkim i średnim nasileniu w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. stany onkologiczne wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza).

#### Sposób użycia

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu. Dorośli: jednorazowo od 500mg do 1000mg (1 do 2 tabletek). W razie potrzeby dawkę można powtarzać 2 lub 3 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 500mg do 1000mg (1 do 2 tabletek) na dobę. Nie należy przekraczać dawki 3g na dobę.

#### Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku, astma oskrzelowa, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ciężka niewydolność serca, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, stosowanie leku metotreksat, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ciąża, laktacja, reumatoidalne zapalenie stawów, nadmierne krwawienia miesięczne.