



apteka  
w sieci

## Polopiryna S tabletki 0.3g x 20szt

Cena: 9,93 zł



### Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać leku:

Tabletki

#### Dawka:

300 mg

#### Opakowanie:

20 tabletek

#### Skład:

Kwas acetylosalicylowy 300 mg oraz inne składniki: skrobia kukurydziana, celuloza sproszkowana, celuloza mikrokryształiczna

#### Działanie:

Polopiryna S zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

#### Wskazania:

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

#### Przeciwwskazania:

Produktu nie należy stosować w następujących przypadkach:

\* nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet

wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 8 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.

- \* nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;
- \* astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;
- \* czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);
- \* ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
- \* ciężka niewydolność serca;
- \* zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);
- \* niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej;
- \* jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność (patrz punkt 4.5);
- \* u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a;
- \* ostatniego trymestru ciąży i karmienia piersią.

#### Dawkowanie:

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Przed użyciem przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania.