



apteka
w sieci

Proktis-M PLUS maść doodbytnicza 30 g

Cena: 31,40 zł

Opis słownikowy

Producent	FARMA DERMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy



www.aptekawsieci.pl

Opis produktu

Producent:

FARMA DERMA

Postać:

Maść

Opakowanie:

Tubka z aplikatorem 30 g

Skład:

Wazelina biała, olej wazelinowy, glikol propylenowy, polidokanol, fitosomy escyny i betasitosterolu, fitosomy kwasu glicyryzynowego, BHT, izopropyl paraben, izobutyl paraben, butyl paraben, sól sodowa kwasu hialuronowego

Działanie:

- Polidokanol dzięki miejscowemu działaniu znieczulającemu uśmierza ból i świąd.
- Escyna (fitosomy escyny) - uszczelnia ściany naczyń włosowatych, zmniejsza nadmierną ich kurczliwość oraz przywraca elastyczność, - usprawnia przepływ krwi w naczyniach żylnych, przeciwdziała zastojom żylnym, zapobiega powstawaniu zakrzepów wewnątrznaczyniowych, - zewnętrznie na skórę wywiera działanie ściągające i przeciwzapalne.
- Kwas glicyryzynowy (fitosomy kwasu glicyryzynowego) - o działaniu hamującym reakcje zapalne, - działa odbudowująco na naskórek.



- Betasitosterol (fitosomy betasitosterolu) - wzmacnia warstwę lipidową naskórka, - fitosterole działają stabilizująco na strukturę błon, przeciwzapalnie i przeciwwysiękowo, - wywierają wpływ przeciwzakrzepowy, - wzmagają regenerację m.in. tkanki łącznej i nabłonkowej, to naturalne inhibitory mediatorów bólu i stanu zapalnego.

Wskazania:

Jako środek wspomagający proces regeneracji błony śluzowej kanału odbytu i odbytnicy; po zabiegach i operacjach chirurgicznych, w chorobie hemoroidalnej przy wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidach, w stanach zapalnych odbytu i odbytnicy, w zapaleniach krypt, pęknięciach i szczelinach odbytu, przetokach okołoodbytniczych.

Przeciwwskazania:

Indywidualna, stwierdzona już nadwrażliwość na jeden ze składników.

Sposób użycia:

Dokładnie umyć ręce przed użyciem preparatu. Stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem, jeżeli to możliwe najlepiej po wypróżnieniu, nakładać miejscowo cienką warstwę maści. Do stosowania doodbytniczego służy odpowiedni aplikator dołączony do opakowania. Należy przykręcić aplikator do tuby i wycisnąć maść aż aplikator będzie pełen. Włożyć aplikator do odbytu ponownie nacisnąć tubę, tak aby maść przedostała się do kanału odbytu. Po użyciu aplikator należy oczyścić i nałożyć na niego nasadkę ochronną.