

# Pyrantelum OWIX 250mg/5ml zawiesina doustna 15ml

Cena: 18,75 zł



## Opis słownikowy

Producent	MEDANA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Zawiesina doustna

### Opakowanie

Buteleczka 15 ml

### Skład

Substancją czynną leku jest pyrantel. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu). Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420) glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbat 80, powidon, arpmat morelowy emulsia symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.


### Działanie

Lek działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych). Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów jelit. Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

### Wskazania

Zakażenia owsikiem, zakażenia glistą ludzką, zakażenia tęgoryjcem dwunastnicy i tęgoryjcem amerykańskim.

### Sposób użycia



zalecana dawka u dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10kg: w glistnicy: zazwyczaj wystarczające jest podanie jednorazowe, jednak w przypadku braku skuteczności dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach. w owsicy: 11mg/kg jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach. w zakażeniu tęgoryjcem dwunastnicy lub tęgoryjcem amerykańskim: 11mg/kg raz na dobę przez kolejne 3 dni.

Dawkowanie w zależności od masy ciała: 11-16kg 2,5ml; - 17-28kg 5.0ml; - 29-39kg 7,5ml; - 40-50kg 10ml; - 51-62kg 12,5ml; - 63-75kg 15ml; - dorośli o masie ciała > 75kg 20ml.

Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczenie powinna prowadzić jednocześnie cała rodzina chorego. Aby uniknąć nawrotu zakażenia, należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia lekarz zaleci wykonanie badań, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pasożyty zostały usunięte.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje piperazyne. Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem u dzieci w wieku poniżej 2 lat.