



Radirex Plus syrop 125 g



Cena: 11,58 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	HERBAPOL WROCLAW
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Herbal praeparatio

Opis produktu

Postać

Syrop

Opakowanie

125 g

Działanie

Syrop **Radirex Plus** to lek o działaniu przeczyszczającym, stosowany tradycyjnie w zaparciach. Zawiera korę kruszyny i korzeń rzewienia, źródło pochodnych 1,8 dihydroantracenu, które wpływają na czynność motoryczną okrężnicy, przyspieszając pasaż jelitowy, redukując resorpcję płynów. Przeczyszczające działanie leku występuje w 6-8 godzin po przyjęciu leku.

Wskazania

Radirex Plus stosowany jest tradycyjnie w zaparciach.

Sposób użycia

- **Dorośli:** 30 ml (2 łyżki stołowe) przed snem
- **Dzieci powyżej 12 lat:** 10-15 ml (2 do 3 łyżeczek od herbaty) przed snem.

Ostrzeżenia



apteka
w sieci

Leku **Radirex Plus** nie należy stosować w przypadku:

- niedrożności jelit,
- atonii jelit,
- biegunki,
- zapalenia wyrostka robaczkowego,
- ostrej i przewlekłej choroby zapalnej jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna),
- odwodnienia i zaburzenia elektrojelitowego,
- bólu brzucha o niejasnej etiologii,
- uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku **Radirex Plus** należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na zawartość 12,4 g sacharozy w jednej łyżce stołowej syropu, leku nie powinni stosować chorzy na cukrzycę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Skład

Substancja czynna: wyciąg płynny (1:1) złożony z : korzenia rzewienia (*Rhei radice*), kory kruszyny (*Frangulae cortice*), owocu kopru włoskiego (*Foeniculi fructu*), owocu kminku (*Carvi fructu*) (5/4/0,5/0,5) -10,0 g [ekstrahent: etanol 50% v/v]. Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona.

15 ml syropu (jedna łyżka stołowa) zawiera 12,7 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A. Syrop zawiera do 3,5% m/m etanolu.