



Rajstopy uciskowe PREMIUM CCL 2 PANI TERESA



Cena: 150,00 zł

Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Rajstopy uciskowe (II klasa kompresji)

Opakowanie

1 para

Opis

Medyczne wyroby uciskowe zalecane są w kompresji jako podstawa leczenia chorób żylnych. Zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa przepływ chłonki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Pomagają redukować obrzęk, łagodzić dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych zmian skórnych spowodowanych żylakami, a także przyspieszają gojenie ran. Medyczne wyroby uciskowe **PREMIUM** cechują się dłuższą wytrzymałością i delikatniejszym splotem materiału.

Wskazania

Wyroby medyczne **PANI TERESA PREMIUM CCL 2** stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwężania średnicy żył.

Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar rozmiar.



T G D A		Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	I	II	III	IV	V	VI
		cG	Obwód uda (około 5 cm poniżej kroku)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cF	Obwód w połowie uda (połowa odległości pomiędzy rzepką i krokiem)	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63		
cE	Obwód powyżej środka rzepki; kolano delikatnie rozluźnione	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51		
cD	Obwód pod kolaniem (w odległości 2 palców poniżej kolana)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48		
cC	Obwód w najszerszym miejscu łydki	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49		
cB₁	Obwód na początku mięśnia łydki / zakończeniu ścięgna Achillesa	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39		
cB	Obwód powyżej kostki, w najwęższym miejscu	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		

	Pomiar	Krótkie	Długie
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A-G	62-71 cm	72-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-38 cm	39-44 cm

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył). Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk sinicy).

Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończosznicych o działaniu uciskowym należy skonsultować ze specjalistą.



Parametry

Długość	długie, krótkie
Kolor	jasny beż, beż, ciemny beż (tylko palce zamknięte), czarny
Palce	palce otwarte, palce zamknięte
Rozmiar	I, II, III, IV, V, VI