



apteka  
w sieci

## Recenum Junior saszetki 10 szt.

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

Cena: 22,94 zł



### Opis słownikowy

Dawka	30 mg
Opakowanie	10 saszetek
Postać	granulat do sporządzania zawiesiny
Producent	US PHARMACIA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Racecadotrilum

### Opis produktu

#### Postać

Granulat

#### Opakowanie

Saszetki x 10 szt.

#### Działanie

**Recenum Junior** to lek stosowany w doraźnym leczeniu biegunki. Powinien być przyjmowany jednocześnie z dużą ilością płynów i wspomagającą dietą, gdy nie są one same wystarczające do kontroli biegunek i gdy biegunka nie może być leczona przyczynowo. Racekadotryl może być stosowany jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

#### Wskazania

Doraźne leczenie objawów ostrej biegunki u dzieci powyżej 6. roku życia.

#### Sposób użycia

Granulat może być dodawany do jedzenia lub zmieszać z wodą w szklance, dobrze wymieszać i natychmiast podać dziecku. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy białą zawiesinę.

Dawka zalecana uzależniona jest od masy ciała dziecka: 1,5 mg/kg na dawkę (co odpowiada 1-2 saszetkom), 3 razy na dobę w regularnych odstępach.



• U dzieci o masie ciała od 13 do 27 kg: jedna saszetka na dawkę. Dawkę należy stosować 3 razy na dobę, czyli dawka dobową to 3 saszetki (3 razy dziennie po 1 saszetce).

• U dzieci o masie ciała od 27 do 40 kg: dwie saszetki na dawkę. Dawkę należy stosować 3 razy na dobę, czyli dawka dobową to 6 saszetek (3 razy dziennie po 2 saszetki).

• U dzieci o masie ciała poniżej 13 kg lekarz może zalecić stosowanie leku Recenum Baby 10 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, w saszetce.

Leczenie powinno być kontynuowane do czasu oddania dwóch normalnych stolców i nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). **Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających (w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty).**

### Ostrzeżenia

Leku **Recenum Junior** nie należy stosować jeśli dziecko ma uczulenie na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli u dziecka występuje nietolerancja niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem dziecku leku Recenum Junior.

### Skład

Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda saszetka zawiera 30 mg racekadotrylu. Pozostałe składniki to: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K30).