



Recigar 1,5mg x 100 tabl.

Cena: 58,16 zł



Opis słownikowy

Producent	ADAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

100 tabletek

Skład

Substancją czynną leku jest cytyzyna. Każda tabletki zawiera 1,5 mg cytyzyny.

- **Pozostałe składniki to** - Rdzeń tabletki: Hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
- **Skład otoczki** - AquaPolish P green Project 16712 [hypromeloza (E464), celuloza mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)], aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

Działanie

Recigar przeznaczony jest do stosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Sposób użycia

Zalecana dawka

Lek **Recigar** należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem:

Od 1 do 3 dnia	1 tabletkę co 2 godziny	6 tabletek
Od 4 do 12 dnia	1 tabletkę co 2,5 godziny	5 tabletek
Od 13 do 16 dnia	1 tabletkę co 3 godziny	4 tabletki
Od 17 do 20 dnia	1 tabletkę co 5 godzin	3 tabletki
Od 21 do 25 dnia	1-2 tabletki na dobę	do 2 tabletek

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

Na blistrze oznaczone są kolejne dni przyjmowania leku Recigar.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu w przypadku:

- uczulenia na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- niestabilnej dławicy piersiowej
- przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego
- klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca
- niedawno przebytego udaru mózgu
- w okresie ciąży i karmienia piersią

Ostrzeżenia

Lek **Recigar** powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku **Recigar**, należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, miażdżycę tętnic i inne choroby obwodowe naczyń krwionośnych, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, chorobę refluksową przełyku, nadczynność tarczycy, cukrzycę, schizofrenii, niewydolność nerek i wątroby
- jeśli pacjent jest osobą w wieku powyżej 65 lat.