



apteka
w sieci

Restonum LS tabletki 30szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 21,38 zł



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

1 op. 30 tabletek


Skład

1 tabletkę zawiera: Węglan magnezu - 266,08,10mg (co odpowiada 60mg jonów magnezu), Fumarany żelaza - 61,44mg (co odpowiada 20mg jonów żelaza), Witamina C - 50mg, Witamina B6 - 0,7mg, Witamina B12 - 2,5mcg.

Magnesium L-asparagmum, Magnesium carbomcum, Ferrum fumaratum Acidum L-ascorbicum, Pyridoxini hydrochloridum, Sorbitol (substancja wypełniająca), węglan magnezu, L-asparaginian magnezu, celuloza (substancja wypełniająca), kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), cyjanokobalamina, chlorowoderek pirydoksyny, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

Działanie

Preparat do postępowania dietetycznego w stanach zaburzeń gospodarki żelaza i magnezu i ich niedoborów oraz w przebiegu wtórnej postaci RLS- zespół niespokojnych nóg. Żelazo zawarte w preparacie pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, hemoglobiny oraz transporcie tlenu w organizmie. Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.



Zespół niespokojnych nóg (RLS – restless legs syndrome, choroba Ekboma) jest najczęstszym zaburzeniem ruchowym podczas snu. Objawia się nieprzyjemnymi doznaniem czuciowymi w nogach podczas snu, długiego siedzenia lub leżenia (pieczenie, mrowienie, cierpienie). Potrzeba poruszania nogami pozwala pozbyć się uciążliwych dolegliwości. Syndrom niespokojnych nóg może prowadzić do bezsenności

Wskazania

Zespół niespokojnych nóg, skurcze nóg, ponadto w stanach zaburzonego wchłaniania żelaza w przebiegu między innymi celiakii, przewlekłego zapalenia trzustki, upośledzonego wchłaniania magnezu, niedokrwistości z niedoboru żelaza. Przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

Sposób użycia

Dorośli: 1 tabletkę 2 razy dziennie. Preparat należy przyjmować na czczo, godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim, popijając dużą ilością wody. Spożywanie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia

Przeciwwskazania i środki ostrożności.

Produkt nie jest przeznaczony dla pacjentów uczulonych na którąkolwiek z zawartych w nim substancji. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed rozpoczęciem kuracji powinny skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Produkt powinien być podawany pod nadzorem lekarza. Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym i nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.