



Scorbolamid drażetki 20szt

Cena: 12,15 zł



Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Tabletki drażowane

Opakowanie:

20 tabletek

Skład:

1 tabl. drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu.

Wskazania:

Ból i gorączka związane z przeziębieniem lub gripą, bóle głowy, nerwobóle.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na salicylamid lub pozostałe składniki leku (np. żółcień chinolinowa), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); stany, w których zmniejszenie krzepliwości krwi może być przyczyną przedłużającego się krwawienia (stany pooperacyjne, zaburzenia krzepliwości krwi, krwawienia maciczne, miesiączka); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); leku nie należy stosować u dzieci do 12 lat, chorych na gripę lub ospę wietrzną ze względu na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu. kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni



moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu.

Ostrzeżenia:

Ostrożnie stosować u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego. Lek należy stosować ostrożnie w astmie oskrzelowej oraz w niewydolności wątroby lub nerek. Alkohol może nasilać działania niepożądane.

Dawkowanie:

Doustnie, zwykle 1-2 drażetki 3 razy na dobę. Preparat najlepiej przyjmować w czasie posiłku albo popić szklanką wody lub mleka (250 ml).