



apteka
w sieci

Scorbolamid tabletki drażowane 40 szt.

Cena: 19,91 zł



Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Tabletki drażowane

Opakowanie:

40 tabletek

Skład:

1 tabletki drażowana zawiera: substancje czynne: 300mg salicylamidu, 100mg kwasu askorbowego, 5mg rutozydu oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), воск Carnauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę).

Wskazania:

Ból i gorączka związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na salicylamid lub pozostałe składniki leku (np. żółcień chinolinowa), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); stany, w których zmniejszenie krzepliwości krwi może być przyczyną przedłużającego się krwawienia (stany pooperacyjne, zaburzenia krzepliwości krwi, krwawienia maciczne, miesiączka); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po



długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); leku nie należy stosować u dzieci do 12 lat, chorych na grypę lub ospę wietrzną ze względu na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu. kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu.

Ostrzeżenia:

Ostrożnie stosować u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego. Nadwrażliwość na salicylamid lub inne składniki leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 6 lat: doustnie, zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę. Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo popić szklanką wody lub mleka. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.