



## Septolete Junior pastylki twarde 18 szt.

Cena: 9,73 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	18 szt.
Postać	pastylki twarde
Producent	KRKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać leku:

Pastylki o smaku czereśniowym

#### Dawka:

1,2 mg

#### Opakowanie:

18 pastylek

#### Skład:

1 pastylka zawiera: chlorek cetylopirydyniowy 1,2 mg. Pozostałe składniki leku to: maltitol płynny (sucha masa), maltitol, mannitol, lewomentol, olejek cytrynowy, aromat dzięki czerśni, barwnik naturalny czerwony (koszenila E120), glicerol, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, tytanu ditlenek (E171), powidon, Capol 600.

#### Działanie:

Lek Septolete Cherry działa miejscowo odkażająco. Zawiera środek odkażający - chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo, działa również na niektóre wirusy i grzyby. Pastylki odkażają jamę ustną i gardło i w ten sposób łagodzą stany zapalne jamy ustnej i gardła. Dzięki dobrej rozpuszczalności chlorek cetylopirydyniowy dobrze przenika również do trudno dostępnych miejsc błony śluzowej jamy ustnej i gardła i hamuje tam rozwój bakterii. Pastylki Septolete Cherry mają smak czereśniowy. Nie zawierają cukru.



**Wskazania:**

Lekkie zakażenia jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani, początkowy okres zapalenia migdałków podniebiennych).

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którykolwiek z pozostałych leków.

**Ostrzeżenia:**

Nie zażywać w przypadku ran i nadżerek w jamie ustnej. W przypadku ciężkich zakażeń przebiegających z wysoką gorączką, bólami głowy i wymiotami pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować preparat Septotele Cherry tylko po konsultacji z lekarzem. Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że każda pastylka zawiera około 1 g maltitolu. Z powodu powolnej hydrolizy i powolnego wchłaniania z przewodu pokarmowego maltitol wpływa na stężenie glukozy we krwi tylko w nieznacznym stopniu. Pastylki zawierają alkohole wielowodorotlenowe (mannitol, maltitol) które w dużych dawkach mogą wywołać biegunkę. Glicerol w dużych dawkach może powodować bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Nie zaleca się zażywania dawek większych od zalecanych.

**Dawkowanie:**

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi do 8 pastylek na dobę. Należy ssać pastylkę co 2 do 3 godzin. U dzieci w wieku powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek na dobę, u dzieci w wieku 10-12 lat do 6 pastylek na dobę. Pastylki należy ssać co 3 do 4 godzin. Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed lub w czasie jedzenia.