



Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu 16 szt.

Cena: 16,58 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	16 szt.
Postać	pastylki twarde
Producent	KRKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Pastylki twarde (smak cytryny i czarnego bzu)

Opakowanie

1 op. 16 pastylek, ulotka

Skład

Substancje czynne w jednej pastylce: chlorowodorek benzydaminii 3mg, chlorek cetylpirydyniowy 1mg. Substancje pomocnicze: olejek miętowy, lewomentol, kwas cytrynowy bezwodny (E 330), sukraloza (E 995), izomalt (typ M) (E 953), aromat cytrynowy (zawierający butylohydroksyanizol (E 320)), aromat kwiatu bzu (zawierający glikol propylenowy (E 1520)), barwnik kurkumina (E 100) (zawierający benzoesan sodu (E 211)), kompleksy miedziowe chlorofiliny (E 141) (zawierający glikol propylenowy (E1520))

Działanie

Lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i antyseptycznym. Substancje czynne w preparacie to chlorowodorek benzydaminii i chlorek cetylpirydyniowy. Stosowanie pastylek działa dezynfekująco na jamę ustną i gardło. **Septolete Ultra** zmniejsza objawy zapalenia gardła, krtani, dziąseł, ból, obrzęk i zaczerwienienie.

Wskazania



Polecany w leczeniu podrażnienia gardła, jamy ustnej i dziąseł, w zapaleniu dziąseł oraz zapaleniu gardła i krtani.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: zaleca się powoli ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin (3-4 pastylki dziennie).

Dzieci od 6. do 12. roku życia: ssać jedną pastylkę co 3 do 6 godzin (maksymalnie 3 pastylki dziennie).

Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki. Nie stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po 3 dniach stosowania objawy nie miną lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Pastylki przyjmować na godzinę przed jedzeniem lub godzinę po posiłku. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży. Ze względu na zawartość izomaltu osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinny przyjmować leku.