



apteka
w sieci

Simetic FORTIS kapsułki miękkie x 60 szt.

Cena: 8,88 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	5 dni
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Kapsułki miękkie

Opakowanie

60 szt.

Wskazania

Produkt **Simetic FORTIS** przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, odbijania, uczucia wzdęcia, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powoduje i ucisku w jelitach.

Produkt zalecany jest pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (endoskopii, ultrasonografii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, dzięki czemu poprawia jakość uzyskiwania obrazów.

Sposób użycia

Kapsułki stosować doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowych.

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach

- Dorośli - doraźnie, 1-2 kapsułki 3-4 razy dziennie. Maksymalnie 8 kapsułek dziennie (640mg symetykonu)



- Kobiety w ciąży - dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę - nie jest wymagana zmiana dawkowania
- Dzieci od 6 do 18 roku życia - doraźnie, 1 kapsułka 3 razy dziennie. Maksymalnie 3 kapsułki dziennie (240mg symetykonu)

Przygotowanie do badań diagnostycznych

- Dorośli - na 1 dzień przed planowanym badaniem diagnostycznym 1 kapsułka 3 razy dziennie, a w dniu badania diagnostycznego 2 kapsułki rano, na czczo.
- Kobiety w ciąży - dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę - nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 6 do 18. roku życia - na 1 dzień przed planowanym badaniem diagnostycznym 1 kapsułka na 3 razy dziennie, a w dniu badania diagnostycznego 2 kapsułki rano, na czczo.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu,
- dzieci w wieku poniżej 6. roku życia,
- stwierdzenie lub podejrzenie perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować więcej niż 8 kapsułek dziennie u dorosłych i 3 kapsułki dziennie u dzieci powyżej 6. roku życia. Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę między zażyciem wyrobu medycznego Simetic Fortis, a innego preparatu.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4-godzinny odstęp. Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład

Symetykon 80g