



apteka  
w sieci

# Spumax wzdęcia 125 mg kapsułki 30 szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

Cena: 9,11 zł



## Opis słownikowy

Dawka	125 mg
Opakowanie	30 szt.
Postać	kapsułki miękkie
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Symetykon

## Opis produktu

### Postać

Kapsułki żelatynowe

### Opakowanie

30 szt.

### Wskazania


Spumax wzdęcia wskazany jest do stosowania:

- w celu łagodzenia objawów żołądkowo-jelitowych spowodowanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak: wzdęcia, odbijanie, uczucie pełności, niestrawność czynnościowa,
- w celu łagodzenia objawów bólowych spowodowanych skurczem w dolnej części brzucha, bóle spowodowane gazami pooperacyjnymi oraz w zespole jelita drażliwego,
- w celu przygotowania do badań diagnostycznych, np. badań radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.

### Sposób użycia

#### W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:

Wiek	Pojedyncza dawka
------	------------------



Dorośli i młodzież od 14. roku życia

1-2 kapsułki Spumax wzdęcia  
(odpowiadające 125-250 mg symetykonu)

**Spumax wzdęcia** powinien być zażywany w trakcie lub po posiłku. Kapsułki powinny być zażywane bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu (mp. 1 szklanką wody). Okres stosowania uzależniony jest od przebiegu zaburzeń. Jeśli to konieczne, spumax wzdęcia może być stosowany przez dłuższy okres czasu.

**W celu przygotowania do badania:**

Wiek	Dzień przed badaniem
Dorośli, młodzież i dzieci od 6. roku życia	2-3 kapsułki Spumax wzdęcia (odpowiadające 250-375 mg symetykonu)

W przypadku nieprzyjęcia Spumax wzdęcia, należy kontynuować stosowanie bez zmiany dawki.

**Ostrzeżenia**

Wyrobu medycznego nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników preparatu. Wyrobu medycznego nie należy stosować po zabiegach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego.

W przypadku powtarzających się długotrwałych dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy skonsultować się z lekarzem w celu zdiagnozowania przyczyny tych dolegliwości oraz wprowadzenia odpowiedniego leczenia.

**Skład**

1 miękka kapsułka żelatynowa zawiera 125 mg symetykonu. Substancjami pomocniczymi są: żelatyna, 85% glicerol i żółcień chinolinowa (E104).