



apteka
w sieci

Starazolin Free 0,5 mg/ml roztwór do oczu 10ml



Cena: 19,50 zł

Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

Pojemnik 10ml

Skład

Substancją czynną leku jest tetryzoliny chlorowodorek. Jeden ml kropli zawiera 0,5mg tetryzoliny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas borowy, boraks, woda oczyszczona.

Działanie

Sterylny roztwór kropli do oczu, nie zawierający środka konserwującego. Starazolin Free zawiera jako substancję czynną tetryzoliny chlorowodorek, który należy do grupy leków zwężających naczynia krwionośne oka.

Wskazania

Lek ten stosuje się w przypadku niezakaźnego podrażnienia (lub) zaczerwienienia oka, wywołanego przez dym, wiatr, chlorowaną wodę lub światło, jak również w przypadku alergicznego zapalenia oka (np. kataru siennego, uczulenia na pyłki).

Sposób użycia



Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Jeśli nie przepisano inaczej, zakraplać jedną kroplę do każdego podrażnionego oka 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 12 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Lek **Starazolin Free** jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jeśli po upływie 2 dni od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa lub podrażnienie i zaczerwienienie oka utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni jest wyłącznie dozwolone pod nadzorem lekarza.

Ostrzeżenia

Nie należy stosować preparatu:

- jeśli pacjent ma uczulenie na tetryzolinochlorowoderek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączenia,
- Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub naczyń krwionośnych (np. chorobę tętnic wieńcowych serca lub nadciśnienia tarczycy, porfirię lub cukrzycę,
- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze,
- Jeśli pacjent ma łagodny rozrost prostaty (gruczołu krokowego),
- U dzieci w wieku poniżej 2 lat.