



apteka
w sieci

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Sudafed XyloSpray HA dla dzieci aerozol do nosa 10 ml



Cena: 21,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Xylometazolinum

Opis produktu

Postać

Aerozol

Opakowanie

10ml

Działanie

Aerozol do nosa **Sudafed XyloSpray HA** dla dzieci zawiera substancję czynną ksylometazolinę, która wspomaga obkurczyć naczynia krwionośne wewnątrz jamy nosowej, redukując obrzęk błony śluzowej nosa i ułatwiając oddychanie. W skład preparatu wchodzi również kwas hialuronowy, nawilżający i chroniący błonę śluzową nosa.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie przekrwienie błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa, występującego w przebiegu przeziębienia lub zapalenia zatok.

Sposób użycia

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę leku Sudafed XyloSpray Ha dla dzieci do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż 5-7 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.



Sudafed XyloSpray HA dla dzieci nie należy stosować:

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;
- u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca);
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przelnosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odstonięciem opony twardej;
- u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi;
- pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Skład

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Każda dawka (70 µg (mikrogramów) co jest równoważne 0,070 ml) leku Sudafed XyloSpray HA dla dzieci zawiera 35 µg (lub 0,035 mg) ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki: sodu hialuronian, sorbitol (E420), glicerol (E422), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.