

# Tadalafil Maxigra 10mg tabletki x 2 szt.



Cena: 24,89 zł

## Opis słownikowy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Producent   | POLPHARMA           |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

## Opis produktu

### Postać

Tabletki

### Opakowanie

2 szt.

### Działanie

**Tadalafil Maxigra** to lek dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji - stanem, w którym mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Substancją czynną leku **Tadalafil Maxigra** jest tadalafil, należący do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, **Tadalafil Maxigra** pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne członka, dzięki czemu umożliwia napływ krwi do członka, poprawiając erekcję.

### Wskazania

Leczenie zaburzeń erekcji.

### Sposób użycia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki leku **Tadalafil Maxigra** są przeznaczone do przyjmowania doustnego tylko u mężczyzn. Tabletki należy połykać w całości,



popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków.

**Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg**, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Lek do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby.

Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę. Leku nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu. Ważna jest świadomość, że lek **Tadalafil Maxigra** nie działa przy braku stymulacji seksualnej.

Istotne jest także zaaranżowanie gry wstępnej, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku **Tadalafil Maxigra** nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

### Ostrzeżenia

Leku **Tadalafil Maxigra** nie należy stosować:

- w przypadku uczulenia na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy. Do grupy azotanów należą następujące leki:
  - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran
  - monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Efoxx, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard
  - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonit
  - tetraazotan pentaerytrotolu (Pentaerythryli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum.

Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra nasila działanie tych leków. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przeżył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni.
- jeśli pacjent przeżył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
- jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.
- jeśli pacjent przyjmuje riocygat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Tadalafil Maxigra, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocygat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

### Skład

Substancją czynną leku jest tadalafil. Każda tabletka leku zawiera 10 mg tadalafilu. / Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian; Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk,



żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

apteka  
w sieci