



apteka
w sieci

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Tantum Rosa puder 500mg saszetki x 10 szt.

Cena: 26,68 zł



Opis słownikowy

Producent	ANGELINI PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Proszek

Dawka:

500 mg

Opakowanie:

10 saszetek

Skład:

Chlorowodorek benzydaminu 500 mg. Inne składniki leku: chlorek sodu, poliwinylpirolidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy

Działanie:

Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco, odkażająco. Takie działanie likwiduje nieprzyjemne uczucie nieświeżości i dyskomfortu towarzyszące różnego typu infekcjom. Lek szybko wchłania się do tkanek objętych procesem zapalnym zmniejszając objawy infekcji. TANTUM ROSA działając przeciwzapalnie zmniejsza obrzęk, przekrwienie śluzówki pochwy i sromu. Lek bezpośrednio po zastosowaniu zmniejsza odczuwanie dolegliwości: bólu, świądu, pieczenia. TANTUM ROSA, jak wykazują badania nie wpływa na fizjologiczną florę pochwy, lek nie hamuje rozwoju najbardziej istotnego jej składnika - pałeczek kwasu mlekowego. TANTUM ROSA można stosować bezpiecznie u kobiet w każdym wieku.



Wskazania:

Do leczenia zapalenia sromu i pochwy, zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia, również po chemio i radioterapii, profilaktyka przed i pooperacyjna w ginekologii, higiena osobista w okresie połogu.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego skład.

Ostrzeżenia:

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, preparatów o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 0,5-1 litrze przegotowanej wody. W połogu: zewnętrznie do przemywania krocza od 1 do 2 razy na dobę. W pozostałych wskazaniach: płukać pochwę roztworem od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W przypadku wrażenia, że działanie preparatu jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.