



apteka  
w sieci

# Terbinafina Ziaja krem 10mg/g 15g

Cena: 9,11 zł



## Opis słownikowy

Producent	ZIAJA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Krem

### Opakowanie

Tubka 15 g

### Dawka

10mg/g

### Skład

Substancja czynna: 1 g kremu zawiera 10 mg chlorowodoru terbinafiny Substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, sorbitanu stearynian (Typ 50), cetylolu palmitynian (15), polisorbitat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

### Działanie

Lek działa grzybobójczo (powoduje śmierć grzybów) na grzyby wywołujące zakażenia skóry u ludzi, jak dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

### Wskazania



Krem polecany w leczeniu: grzybica stóp, grzybica podeszwowa stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej, łupież pstry, drożdżyca skór.

#### Sposób użycia

Przed zastosowaniem leku należy oczyścić i osuszyć leczone miejsca na skórze, a następnie nanieść na nie niewielką ilość leku, lekko wcierając. Nakładać cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę i na miejsca bezpośrednio ją otaczające, delikatnie wcierając. Jeśli chorobowo zmienione miejsca znajdują się w fałdzie skórny (pod piersią, pomiędzy palcami stóp lub dłoni, w pachwinie lub pod pośladkami) na skórę można nałożyć jałową gazę, szczególnie na noc. Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce.

- Grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień.
- Grzybica podeszwowa stóp - 2 razy na dobę przez 2 tygodnie.
- Grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień.
- Grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień.
- Drożdżyca skóry - raz na dobę przez 1 tydzień.
- Łupież pstry - raz na dobę przez 2 tygodnie.

#### Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż substancja czynna leku przenika do mleka matki. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym piersi. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.