



Traumon spray 0,1g/1ml 50 ml



Cena: 27,39 zł

Opis słownikowy

Producent	MEDA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

Spray 50ml

Skład


Substancja czynna: etofenamat 100 mg/ml Substancje pomocnicze: adypinian diizopropylu, eter makroglu oleinocetylowy, makrogl 400, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Działanie

Preparat wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Polecany w urazach sportowych jak chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych w obrębie stawów, kręgosłupa, kolan i barków. Wskazaniem do stosowania są również tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów; choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych; reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej; zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych; zapalenie nadkłykci.

Wskazania

Bóle reumatyczne, zwyrodnienia, urazy sportowe, stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów, w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, kolanowych i barkowych. reumatyzmie pozastawowym: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany



chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci.

Sposób użycia

apteka
w sieci

Zewnętrznie. Miejscowo, nanosić na bolące miejsca kilkakrotnie w ciągu doby. Leczenie trwa zwykle 2-4 tygodni. Nie powinno się stosować na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie ani na błony śluzowe. Nie stosować u dzieci do 14 roku życia.