



apteka
w sieci

Ulgix Wzdęcia 80mg kapsułki miękkie 50 szt.

Cena: 9,49 zł



Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	50 szt.
Postać	kapsułki miękkie
Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Simeticonum

Opis produktu

Postać

Kapsułki

Opakowanie

50 szt.

Działanie

Preparat **Ulgix Wzdęcia** zawiera symetykon, będący stabilną mieszaniną polimeru silikonu i dwutlenku krzemu o właściwościach odpinających i absorbujących gazy jelitowe. **Ulgix Wzdęcia** stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w wyniku fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia. Należą do nich: uczucie pełności, wzdęcia, odbijanie, które mogą być m.in. wynikiem błędów dietetycznych.

Ulgix Wzdęcia może być stosowany również pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej techniką obrazową, takich jak: radiografia, ultrasonografia i endoskopia. Przyczynia się do usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne.

Wskazania

Wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.

Sposób użycia



Wyrób medyczny **Ulgix Wzdęcia** w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

Objawy związane z nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.

• **Osoby powyżej 18 roku życia:** 1 kapsułka 3-4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej.

• **W dniu poprzedzającym badanie:** 1 kapsułka 3 razy dziennie, w dniu badania: 2 kapsułki rano na czczo. Kapsułki można przyjmować przed, w trakcie i po posiłkach, popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).

W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnie dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować produktu, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej. Jeśli dotychczasowe objawy utrzymują się lub nasilają i występują nowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe zaleca się konsultację lekarską w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Skład

1 kapsułka żelatynowa wyrobu medycznego **Ulgix Wzdęcia** zawiera: 80 mg synstetykonu. Substancja pomocnicza: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa.