



UniGel Procto czopki 5 szt.

Cena: 19,06 zł



Opis słownikowy

Producent	VH PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Czopki

Opakowanie

5 szt.

Działanie

Czopki **UniGel Apotex Procto** są wyrobem medycznym, wspomagającym gojenie zarówno ostrych, jak również przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy. Czopki redukują krwawienie, pieczenie i uczucie swędzenia.

Wskazania

Wspomaganie gojenia ostrych i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy:

- hemoroidów
- szczelin odbytu
- u pacjentów po zabiegu hemoroidów metodą Barrona (Ligatura Barrona).

Sposób użycia



- Czopek wyjąć z opakowania i wprowadzić do odbytnicy, najlepiej po wypróżnieniu i podmyciu się.
- Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrozonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, czopki należy stosować raz na dobę, najlepiej przed snem.

Stosować nie dłużej niż 30 dni. Jeśli w ciągu 7 dni dolegliwości nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. U dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią czopki można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. W przypadku chorób odbytnicy szczególnie ważne jest zapewnienie właściwej higieny oraz regularne wypróżnianie się. Konieczne jest przyjmowanie wystarczającej ilości płynów, unikanie spożywania pikantnych potraw oraz zwiększenie spożycia pokarmów zawierających dużo błonnika.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, w przypadku niewystarczającej długości odbytnicy (u dzieci do 3 miesiąca lub wcześniaków). W przypadku wystąpienia zaparcia, biegunki, obfitego krwawienia, poważnej choroby, po urazach okolic odbytu i odbytnicy, choroby okolic anorektalnej (np. przetoka lub ropień), resekcji odbytnicy, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie połykać. Czopek przeznaczony jest do jednorazowego użytku i aplikacji doodbytnicznej. W przypadku wystąpienia niepożądanych przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpi niewielkie podrażnienie błony śluzowej odbytnicy u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością np. łagodne swędzenie lub pieczenie, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

Czopek zawiera sproszkowany kopolimer HEMA-HAS i bazę tłuszczową (Adeps solidus).