



Urofuraginum 50mg tabletki x 30 szt.

Cena: 12,84 zł



Opis słownikowy

Producent	ADAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Dawka

50 mg

Opakowanie

30 tabletek

Skład

Furagina 50 mg oraz składniki pomocnicze: skrobia kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy

Działanie

Furagina to pochodna nitrofuranu, chemioterapeutyk aktywny wobec Gram-dodatnich i Gram-ujemnych bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. Działa silnie bakteriostatycznie m.in. na *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *S. faecalis*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp., *Klebsiella* spp., *Escherichia* spp., *Enterobacter* spp. Wykazuje działanie przeciwprzetrzycowe i niewielkie przeciwgrzybicze. Nie działa na *Pseudomonas aeruginosa* i większość szczepów *Proteus vulgaris*. Furagina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając C_{max} we krwi w ciągu 0,5 h. Stężenia we krwi i tkankach są niewielkie. Jest wydalana z moczem, w którym osiąga stężenia terapeutyczne. Przyjmowanie furaginy z pokarmem wysokobiałkowym zwiększa jej dostępność biologiczną i zwiększa stężenie leku w moczu.



Wskazania

Leczenie zakażenia dolnych dróg moczowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub substancje pomocnicze preparatu. Ciężka niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz). Rozpoznana polineuropatia (np. cukrzycowa). Niedobór G-6-PD (ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej lub hemolitycznej). I trymestr ciąży.

Dawkowanie

Dorośli - pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Należy przyjmować podczas posiłków zawierających białko, które korzystnie wpływa na wchłanianie leku. Lek stosuje się przez 7-8 dni. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.