



apteka
w sieci

Valinger Forte 50 mg tabletki x 2 szt.

Cena: 7,97 zł



Opis słownikowy

Producent	ORION PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Dawka

50 mg

Opakowanie

2 szt.

Działanie


Lek **Valinger Forte** zawiera substancję czynną - **syldenafil**, należący do grupy leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek wspiera rozkurczanie naczyń krwionośnych w penisie, zwiększając napływ krwi do prącia podczas seksualnego podniecenia.

Wskazania

Leczenie mężczyzn z zaburzeniem wzwodu (impotencji).

Sposób użycia

Ten lek należy stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.



Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg. W przeciwnym razie syldenafil w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafil w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować dawki 50 mg.

Leku Valinger Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W razie wrażenia, że działanie leku **Valinger Forte** jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek **Valinger** pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem ponudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych osób, ale zazwyczaj wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku może nastąpić później jeśli zostanie on przyjęty razem z obfitym posiłkiem.

Ostrzeżenia

Leku **Valinger Forte** nie należy stosować:

- w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu,
- jeśli pacjent przyjmuje azotany, gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z tych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi; leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), gdyż ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
- jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Valinger Forte, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
- jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem lub wątrobą.
- jeśli pacjent miał niedawno udar lub zawał serca lub jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- jeśli u pacjenta występują niektóre, rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki).
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletkę zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. / Pozostałe składniki: rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, otoczką: hypromeloza (2910;6 mPa·s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).