



VIAGRA Connect MAX tabletki powlekane x 4 szt.

Cena: 67,24 zł



Opis słownikowy

Producent	UPJOHN EESV
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

4 szt.

Wskazania

Lek VIAGRA Connect MAX przeznaczony jest dla mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, którzy mają trudności z osiągnięciem i/lub utrzymaniem erekcji wystarczającej dla podejmowania aktywności seksualnej.

Sposób użycia

Należy zastosować 1 tabletkę na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę połknąć w całości, popijając wodą. Tabletkę zaczyna działać w ciągu 30-60 minut. Lek można przyjmować do 4 godzin przed planowaną aktywnością seksualną.

Nie przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.

Ostrzeżenia

Leku nie należy przyjmować:

- jeśli pacjent nie ma problemów z erekcją,



- jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów z powodu bólu w klatce piersiowej lub niewydolności serca,
- jeśli pacjent przyjmuje riociguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylanową) z powodu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach,
- jeśli pacjent przyjmuje rytonawir w leczeniu zakażenia HIV,
- jeśli lekarz polecił pacjentowi unikać aktywności seksualnej z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi,
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca,
- odczuwa ból lub dyskomfort w klatce piersiowej / dławica piersiowa,
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby,
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka utrata wzroku lub jeśli stwierdzono u pacjenta pewną wrodzoną chorobę oczu,
- jeśli penis pacjenta jest zniekształcony,
- jeśli pacjent jest uczulony na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Uwagi

Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjent powinien to omówić z farmaceutą lub lekarzem, jeśli:

- aktywność fizyczna o małej lub umiarkowanej intensywności wywołuje u pacjenta silną duszność lub ból w klatce piersiowej,
- pacjent ma problemy z sercem,
- pacjent ma nieregularne bicie serca / kołatanie serca,
- pacjent ma nieleczone lub nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze,
- pacjent przyjmuje którykolwiek z innych leków wymienionych w ulotce,
- pacjent stosuje jakikolwiek inny lek na zaburzenia erekcji,
- u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła erekcja trwająca dłużej niż 4 godziny,
- pacjent cierpi na wrzody żołądka lub skazę krwotoczną,
- u pacjenta stwierdzono łagodne lub umiarkowane problemy z wątrobą,
- u pacjenta rozpoznano ciężkie problemy z nerkami.

Skład

1 tabletki: 50mg syldenafilu. Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg syldenafilu.