



apteka  
w siedlcach

## VICKS AntiGrip Complex saszetki 10 szt.



Cena: 20,80 zł

### Opis słownikowy

Producent	WICKS Pharma
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Proszek w saszetkach

#### Dawka

500mg + 200mg + 10mg

#### Opakowanie

10 szt.

#### Działanie

Lek VICKS AntiGrip Complex zawiera trzy substancje czynne:

- **Paracetamol** jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym. Jest skuteczny w walce z bólem, w tym bólem głowy i bólem gardła oraz obniża gorączkę (działanie przeciwgorączkowe).
- **Gwajafenezyna** (lek wykrztuśny) rozrzedza flegmę ułatwiając odkrztuszanie w mokrym kaszlu.
- **Fenylefryny chlorowodorek** (lek zmniejszający nieżyt nosa) zmniejsza obrzęk nosa i w ten sposób umożliwia jego udrożnienie.

Lek VICKS AntiGrip Complex należy przyjmować jedynie w razie, gdy u pacjenta występuje ból i (lub) gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel. Jeżeli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.



## Wskazania

Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

## Sposób użycia

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby.

Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. Lek ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie do picia w postaci gorącego napoju. Wsypać jedną saszetkę proszku do kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

## Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Dzieci poniżej 12 roku życia. Nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek, nadciśnienie, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba serca, jaskra z wąskim kątem przesączania, porfiria, stosowanie u pacjentów przyjmujących trójpierscieniowe leki antydepresyjne, stosowanie u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni, stosowanie u pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, stosowanie u pacjentów przyjmujących aktualnie inne leki sympatykomimetyczne.

## Skład

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, gwajafenezyna, fenylefryny chlorowodorek. Każda saszetka leku stanowi jedną dawkę leku zawierającą substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezynę 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg.

Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklamianian, sodu cytrynian, aspartam (E951), acesulfam potasowy (E950), mentol w proszku, aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E104).