

VOCALER miód cytryna pastylki do ssania x 12 szt.

Cena: 9,24 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|--------------------------|
| Producent | AFLOFARM |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Postać

Pastylki do ssania o smaku miód i cytryna

Opakowanie

12 pastylek

Skład

Jedna pastylka do ssania zawiera 12 mg wyciągu suchego z porostu islandzkiego (co odpowiada 48 mg porostu islandzkiego) oraz 8,5 mg ekstraktu gęstego z korzenia prawoślazu. Pozostałe składniki: cukier, syrop glukozowy, kwas cytrynowy, L-askorbinian sodu (witamina C), suszony koncentrat aronii, olejek cytrynowy, aromat miodowy, olejek limetkowy, aromat pomarańczowy, beta-karoten.

Pastylki zawierają cukier.

Działanie

Preparat łagodzi chrypkę, przeciążenie strun głosowych oraz suchość w jamie ustnej. Składniki wyrobu medycznego Vocaler miód cytryna powlekają błonę śluzową gardła ochronnym filmem chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych oraz zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia. Wyrób łagodzi podrażnienia oraz dolegliwości związane z chrypką, przeciążeniem strun głosowych oraz suchością w jamie ustnej spowodowaną m.in. kontaktem z dymem tytoniowym lub przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach. Poprzez swoje działanie niweluje przejściowe problemy związane z wydobywaniem głosu i przywraca komfort mówienia bez konieczności odchrząkiwania. Vocaler miód cytryna może być także stosowany profilaktycznie szczególnie u osób narażonych na znaczne obciążenie więzadeł głosowych.



Wskazania

Na chrypę i suchość w gardle. Polecany szczególnie osobom narażonym na nadwyrężanie strun głosowych, jak: nauczyciele, aktorzy, lektorzy, spikerzy, telemarketerzy itp.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na ryzyko zachłyśnięcia.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 1 pastylka do ssania, w zależności od potrzeb kilka razy dziennie. Vocaler miód cytryna może być stosowany przez dłuższy czas, jednak w przypadku braku poprawy po 10 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.